



## GASTROSTOMÍA PERCUTÁNEA

Médico Intervencionista: \_\_\_\_\_

Fellow/ Residente: \_\_\_\_\_

### Hallazgos clínicos y de laboratorio relevantes:

INR: \_\_\_\_\_

Indicación: \_\_\_\_\_

### Anestesia/sedación:

Tipo de anestesia:  Ninguna  Sedación (Mínima / Moderada / Profunda)

Duración de la anestesia/sedación: \_\_\_\_\_ minutos

### MATERIAL

Sonda de gastrostomía de 14 F de silicona con balón de retención de 5 cc. Nombre del dispositivo implantado

Nombre: \_\_\_\_\_ Casa comercial: \_\_\_\_\_

Nº referencia: \_\_\_\_\_ Lote producto: \_\_\_\_\_

### PROCEDIMIENTO

Previa antisepsia de la piel y anestesia de planos superficiales, con control de fluoroscopia se colocan 3 puntos de gastropexia en triángulo y se realiza la punción percutánea del estómago. El estómago se mantiene distendido durante todo el procedimiento con aire administrado a través de la SNG. A través de la punción se introduce la guía de 0,035 y se dilata el tracto gradualmente con dilatadores telescopados hasta 14 F. A continuación se introduce la sonda de gastrostomía a través del introductor pelable.

El resultado es satisfactorio visualizándose la sonda correctamente alojada en el estómago.

### COMPLICACIONES

Procedimiento bien tolerado sin complicaciones.

### CUIDADOS

- Control de constantes.
- Reposo en decúbito supino durante las próximas 12 h.
- Dieta absoluta durante 12 h.
- Iniciar tolerancia con dieta líquida y si no hay incidencias progresar a dieta normal por túrmix.

### RETIRADA DE PUNTOS GASTROPEXIA

En su Centro de Salud en 10 días.

### PRÓXIMO CAMBIO DE SONDA

En 4 meses en su Centro de Salud.